Carrefours de l'innovation
agronomique

Concilier la réduction de la lixiviation nitrique, la restitution d'azote à
la culture suivante et la gestion de l'eau avec les CIMS

J. Constantin , N. Beaudoin, N. Meyer, R. Crignon, H. Tribouillois, B. Mary, E. Justes

4 octobre 2017 | INP-ENSAT Auzeville | Toulouse

Dynamique N en interculture

→ Ex: rotation blé-tournesol
(9 mois d'interculture)

L'effet CIPAN: dynamique des processus

e.g. Thorup-Kristensen et al. 2003; Tonitto et al. 2006

Carrefours de l'innovation
agricole

4 octobre 2017

INP-ENSAT Auzéville | Toulouse

L'effet « Engrais vert »: dynamique des processus

e.g. Thorup-Kristensen et al. 2003; Justes et al. 2009

Carrefours de l'innovation
agronomique

4 octobre 2017

INP-ENSAT Auzeville | Toulouse

Cas d'augmentation du N disponible pour la culture suivante

e.g. Quemada & Cabrera 1995; Thorup-Kristensen et al. 2003; Tejada et al 2008

Carrefours de l'innovation
agronomique

4 octobre 2017

INP-ENSAT Auzerville | Toulouse

Cas de compétition pré-emptive

Nmin du sol sans CIMS

Nmin du sol avec CIMS

Compétition pré-emptive

Impact négatif pour la culture suivante

Carrefours de l'innovation agronomique

4 octobre 2017

INP-ENSAT Auzeville | Toulouse

Effet de la date de destruction sur N disponible

Destruction en novembre

Destruction en février

Réduction de la lixiviation avec des CIMS: expérimentation

Effet des dates de levée et destruction selon le climat

	Site chaud et sec (en haut)	Site froid et humide (en bas)
Levée précoce	--	++
Levée tardive	++	--
Destruction	Jusqu'au 10/02	Jusqu'au 10/12

Constantin et al. 2015

Carrefours de l'innovation
agronomique

4 octobre 2017
INP-ENSAT Auzeville | Toulouse

C/N des résidus et impact sur le rendement variable

Justes et al. 2009

Tonitto et al. 2006

Carrefours de l'innovation
agronomique

4 octobre 2017

INP-ENSAT Auzeville | Toulouse

Effet positif à long terme sur la minéralisation N

Années

72% de N apporté par la moutarde à Boigneville.
60% de N apporté par le radis (et céréales) à Thibie.
23% de N apporté par le ray-grass à Kerlavic.

Carrefours de l'innovation
agronomique

4 octobre 2017

INP-ENSAT Auzerville | Toulouse

Impact à long terme sur la lixiviation et le rendement

Concentration nitrique des eaux de drainage

Rendement

A Thibie - craie (AREP), depuis 1995, Rendement des 3 cultures après CI > Rendement après sol nu (référence 100% pour chaque année)

Constantin et al. 2010

Carrefours de l'innovation agronomique

4 octobre 2017
INP-ENSAT Auzerville | Toulouse

Une réduction du drainage modérée, dépendant de la biomasse

Avec CIMS

Sans CIMS

Peu d'impact sur la disponibilité en eau pour la culture suivante, sauf en cas de destruction très tardive.

Carrefours de l'innovation
agronomique

4 octobre 2017
INP-ENSAT Auzeville | Toulouse

Conclusions et perspectives

- **Les CIMS sont nécessaires**, même avec une fertilisation bien raisonnée, **puisque la minéralisation des matières organiques du sol produit en continu de l'azote**, qui peut alors être lixivié.
- **Les CIMS non-légumineuses sont incontestablement efficaces en tant que « piège à nitrate »**, en interculture courte et longue. Cette efficacité est **moindre pour les couverts de légumineuses mais non négligeable**.
- Les CIMS peuvent avoir un **effet engrais vert**, favorisé par les CIMS légumineuses mais **variable à court terme. A long terme, l'effet est plus globalement positif** grâce à l'augmentation de la matière organique du sol et de la minéralisation. Un **ajustement de la fertilisation azotée est nécessaire** pour la culture suivante.
- **Les CIMS modifient le bilan hydrique** en augmentant l'évapotranspiration et l'infiltration et en diminuant le ruissellement:
 - Généralement **pas d'impact sur la réserve en eau disponible pour la culture principale suivante**.
 - **Réduction fréquente du drainage** → impact sur la recharge des nappes phréatiques.

Les CIMS doivent être adaptés aux conditions pédoclimatiques locales et au système de culture pour conjointement maximiser l'efficacité « piège à nitrate » et l'effet « engrais vert » et minimiser les éventuels dis-services sur la culture principale suivante et la recharge des nappes.