



Carrefours de l'innovation
agronomique



Biodiversité & durabilité des agricultures

11 avril 2019 | Maison des Océans | PARIS

Mélanges variétaux et mélanges plurispécifiques : atouts et contraintes

Enjalbert Jérôme¹, Litrico Isabelle², Fournier Elisabeth³, Médiène Safia⁴, Gauffreteau Arnaud⁴, Bedoussac Laurent⁵

¹ GQE Le Moulon, Gif sur Yvette, ² P3F Lusignan, ³ BGPI, Montpellier,
⁴ Agronomie, Thiverval-Grignon, ⁵ ENSFEA-AGIR, Castanet-Tolosan






Intensification et uniformisation agricole

- Standardisation des pratiques
- Diminution de la biodiversité cultivée




- Perte de biodiversité sauvage associée
- Perte de résilience des systèmes agricoles



Transition agroécologique

Un voie de changement : l'agroécologie

→ Substituer les intrants de synthèse par des régulations naturelles




La diversification, axe central pour la transition agroécologique

→ Plus d'espèces cultivées dans les bassins de production



Éventail des diversifications agricoles



How to implement biodiversity-based agriculture to enhance ecosystem services: a review

Michel Duru^{1,3} · Olivier Therond^{1,3} · Guillaume Martin^{1,3} · Roger Martin-Clouaire^{2,3} · Marie-Angéline Magne^{1,4} · Eric Justes^{1,3} · Etienne-Pascal Journet^{1,3,5} · Jean-Noël Aubertot^{1,3} · Serge Savary^{1,3} · Jacques-Eric Bergez^{1,3} · Jean Pierre Sarthou^{1,3}

Importance de la diversité intra-parcelle :

→ Mélanges variétaux

→ Mélanges d'espèces

→ Agroforesterie




Carrefours de l'innovation
agronomique



11 avril 2019

Maison des Océans | PARIS

Biodiversité, productivité et stabilité : les mécanismes écologiques



Barot et al. 2017



Carrefours de l'innovation
agronomique




11 avril 2019

Maison des Océans | PARIS

Focus sur la diversification intra-parcelle


- Mélange variétal de blé
- Populations de riz
- Plantes de service
- Mélanges fourragers
- Mélanges céréales/légumineuses à graines



1) Diversification intra-spécifique: les mélanges blé


Le constat :

Une pratique qui « monte »!




Pourquoi :

Limiter les risques et simplifier la gestion




Besoins :

Règles d'adaptation aux contraintes locales



1) Diversification intra-spécifique: *les mélanges blé*

- 160 mélanges testés (différents entre agriculteurs)
- Rendements supérieurs à la moyennes des pures (70% des cas)
- Meilleur comportement les années difficiles (2016)
- Mélange > variété pariée par l'agriculteur (90% des cas)
- Impact neutre sur la teneur en protéines
- Attention à la germination sur pied





Crédit photos : Elisabeth Fournier

2) Diversification intra-parcelle: *Populations de Riz du YuanYang*

- Agrosystème durable (1300 ans!)
- Porté par une minorité ethnique isolée (Hani)
- Riz pour principale production
- Dispersion des parcelles (équité du partage de l'eau)


→ Extraordinaire diversité variétale maintenue
(140 variétés, espèces *O. indica* et *O. japonica*)

→ Absence de crise sanitaire majeure




Pyricularia oryzae responsable de la pyriculariose

Crédit photos : BGPI




Structuration des populations de *M. oryzae* sur japonica et indica



2) Diversifications intra-parcelle

Riz au YuanYang : Diviser pour mieux régner

- Co-existence des espèces japonica et indica
- Mécanismes de défense distincts



→ Les variétés indica sélectionnent des souches généralistes et maladaptées

→ La diversité génétique procure une résistance durable à la pyriculariose



Carrefours de l'innovation agronomique



11 avril 2019


Maison des Océans | PARIS

3) Diversification inter-spécifique: *le colza associé*

Utilisation de plantes de service gélives (légumineuses ou non légumineuses) pour réduire l'usage des intrants (azote et pesticides) sur le colza d'hiver

Casdar Alliance (2014-2017)

- Evaluation des services rendus au colza
- Travaux conduits sur différentes espèces compagnes
 - Compilation d'essais sur colza associé (2009-16)
 - Méta-analyse
 - CAPS : Outil d'aide au choix d'espèces à associer



Lorin et al., 2015




Carrefours de l'innovation
agricole



11 avril 2019
Maison des Océans | PARIS

3) Services rendus au colza par les plantes de service



--- colza seul

+ Meilleures performances pour la féverole et féverole-lentille

- Pois seul: légumineuse trop compétitive

Synergies observées pour certaines espèces qui fournissent plusieurs services sans concurrencer le colza

Verret et al., 2017



4) Les mélanges prairiaux multispécifiques semés

- Nécessité de stabiliser fourniture de fourrage et maintenir les espèces

→ Diversité génétique des espèces en mélange = Levier d'action ?



5 mélanges

7 espèces fixes

Diversité génétique des espèces variable entre mélanges



Essai à la station Jouffray Drillaud St Sauvant (86)

Légumineuses

Trifolium repens
Trifolium pratense
Lotus corniculatus
Medicago sativa

Mesures de biomasse par espèce 3 fois/an

Graminées

Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Lolium perenne


Mesures diversité bactérienne par méta-génomique
Printemps/automne année 5

Sans fertilisation
Fauche régulière






4) Effet de la diversité génétique sur les mélanges prairiaux et la biodiversité du sol




Productivité et stabilité



Maintien des espèces et qualité du fourrage

Ordination (NMDS) des mélanges par niveau taxonomique OTU

Effet positif



Diversité bactérienne du sol associée





5) Les mélanges de céréales/légumineuses à graines

- Basées sur la complémentarité fonctionnelle des espèces
- De nombreux services délivrés par ces associations
- Peu pratiquées mais un regain d'intérêt récent

→ Analyse bibliographique des performances de certaines associations en Agriculture Biologique




5) Les mélanges de céréales/légumineuses à graines



→ Les associations permettent d'augmenter rendement et qualité



Les mélanges de céréales/légumineuses à graines



→ Permettent d'accroître la marge :

- En situation défavorable
- Si subventionnées comme les cultures pures

→ **Obstacle majeur : le tri des récoltes**



Les intérêts multiples d'une diversité intra-parcellaire

- Différents atouts agronomiques :
 - une meilleure valorisation des ressources
 - meilleure productivité et qualité
 - une meilleure gestion des risques (accidents climatiques – contrôle des maladies)
 - plus grande stabilité de production



Les intérêts multiples d'une diversité intra-parcellaire

- Différents atouts agronomiques :
 - une meilleure valorisation des ressources
 - meilleure productivité et qualité
 - une meilleure gestion des risques (accidents climatiques – contrôle des maladies)
 - plus grande stabilité de production
- Assurance dans un contexte d'incertitude climatique, mais aussi d'hétérogénéité parcellaire
 - une forme d'agriculture de précision





Les intérêts multiples d'une diversité intra-parcellaire

- Différents atouts agronomiques
 - une meilleure valorisation des ressources
 - meilleure productivité et qualité
 - une meilleure gestion des risques (accidents climatiques – contrôle des maladies)
 - plus grande stabilité de production
- Assurance dans un contexte d'incertitude climatique, mais aussi d'hétérogénéité parcellaire
 - une forme d'agriculture de précision
- Une conduite qui peut toutefois s'avérer plus complexe
 - agronomie, outils de suivi et pilotage, machinisme



Des impacts positifs sur la biodiversité sauvage associée

- Mélanges variétaux de céréales:
 - Impact positif sur des auxiliaires de culture
 - Modification des communautés et activités du sol
 - Impact sur la nutrition des vers de terre (Chasé et al. 2019)
- Impact des mélanges d'espèces sur les communautés sauvages :
 - Effet positif de la diversité des prairies sur la microflore du sol
 - Diversité d'habitats pour de multiples communautés




→ Effets positifs, mais à relativiser avec les effets d'infrastructures paysagères (haies, bandes fleuries...)



Conséquences pour la sélection variétale

- Une sélection centrée sur la culture mono-génotypique :
 - Corrélation variable entre valeur en pure et en mélange
 - **Gains génétiques possibles pour l'aptitude à la co-culture !**
- Mais combinatoire infernale des mélanges...
 - **Plus de combinaisons de variétés de blé que d'étoiles dans notre galaxie !**
- Comment sélectionner des variétés adaptées au mélange ?
 - **Sélection pour l'aptitude au mélange**
 - **Idéotypage de variétés, sur la base de caractères clés et de modélisation**





Rôle des approches participatives

- S'appuyer sur un réseau de praticiens permet d'explorer l'espace des combinaisons
- Idéotypage participatif de mélanges : CAPFLOR, CAPS, Wheatamix ...
 - Co-conception de règles d'assemblage
 - Bases de données sur les variétés et espèces (traits fonctionnels)
 - Capitalisation des expériences des praticiens pour établir des références
- Sélection participative décentralisée :
 - Levier unique pour favoriser la diversification
 - Sélection pour une adaptation locale : diversité des terroirs et pratiques
 - Maintient une diversité génétique *in situ*, garante de la résilience agricole



La mixologie...

Bernard Chevassus-au-Louis :
« *Naissance d'une communauté épistémique...* »



Carrefours de l'innovation
agricole



11 avril 2019
Maison des Océans | PARIS

REMERCIEMENTS :



Isabelle Litrico



Elisabeth Fournier



Safia Médiène



Arnaud Gauffreteau



Laurent Bedoussac

Julie Borg, Isabelle Goldringer, Mourad Hanachi, Etienne-Pascal Journet, Eric Justes, Jean-Benoît Morel, Herve Sanguin, Muriel Valantin-Morison et Valentin Verret .

