



➤ Table ronde : Préserver la relation adulte-jeune en élevage

Guillaume Tixier



> Impact du sevrage tardif en élevage porcin

Christelle KNUDSEN – Ingénieure de recherche
INRAE UMR GenPhySE





Sevrer, mais à quel âge?

Sevrage = transition de l'alimentation lactée à solide

Associé à un:

- Changement d'environnement
- Tractus digestif immature


Sevrages < 3 semaines

- ☹ Santé (diarrhées, mortalité)
- ☹ Croissance
- ☹ Comportement

Ingestion solide faible

Troubles digestifs

Recours à l'antibiothérapie



Conv
3-4 sem

Bio
6-7 sem

Semi
Liberté
10-17 sem



© INRAE

Quid d'un sevrage > 6 semaines en élevage?



Peu de données, et non concordantes

- 😊 Santé digestive
- ? Comportement



Très peu de données

- ? Comportement
- = Performances

Nos résultats:

- 😊 Croissance
- 😊 Démarrage alimentaire
- 😊 Compétences sociales
- ☹ Lésions lors des combats
- ≠ Physiologie digestive 🚧

= Performances ⚠ Petite cohorte
🚧 Analyses comportementales en cours

Et la suite?

- 💡 Evaluation sur cohortes plus larges et sur le terrain (éval santé, performances)
- 💡 Evaluation multicritères
- 💡 Modélisation